



BAISSE DE 34% DU NOMBRE DE PERSONNES PRISES EN CHARGE NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉES SÉROPOSITIVES POUR LE VIH AU SEIN DU TERRITOIRE DU COREVIH LYON VALLÉE DU RHÔNE ENTRE 2016 ET 2019

La surveillance épidémiologique des personnes vivant avec le VIH du COREVIH Lyon Vallée du Rhône en 2019 est un état des lieux de la prise en charge de l'infection à VIH dans la Métropole de Lyon et dans les 4 départements (Ain, Ardèche, Drôme et Rhône) du territoire du COREVIH Lyon Vallée du Rhône.

Elle concerne, plus précisément, les 11 établissements de santé rattachés au COREVIH Lyon Vallée du Rhône*.

Les données de ce rapport sont issues du logiciel Nadis – dossier médical informatisé de spécialité et ne concernent que les personnes informées de la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis. Ces données sont exploitées par le logiciel Dataids.

*Etablissement de santé rattachés au Corevih Lyon Vallée du Rhône.

Ain

•File active du C. H. de Bourg-en-Bresse – Service des Maladies Infectieuses -**BOURG-EN-BRESSE**

Ardèche

•File active du C. H. d'Ardèche Nord – Service Médecine D **ANNONAY**
•File active du C.H. d'Ardèche Méridionale - Service d'Hémovigilance - **AUBENAS**

Drôme

•File active du C.H. de Valence – Service de Pneumologie et d'Infectiologie -**VALENCE**

Métropole de Lyon

•File active de l'Hôpital de la Croix-Rousse - Service des Maladies Infectieuses et Tropicales **HCL - LYON**
•File active de l'Hôpital de la Croix-Rousse - Service d'Hépatogastro-Entérologie **HCL - LYON**
•File active de l'Hôpital Edouard Herriot - Service des Maladies Infectieuses et Tropicales **HCL LYON**
•File active du Réseau ville hôpital Virages Santé - **LYON**
•File active de l'Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes - Fédération de Médecine Interne- **LYON**
•File active du Centre de Vaccinations Internationales & de Médecine des Voyageurs du Tonkin – Médecine Interne, Infectieuse et Tropicale - **VILLEURBANNE**

Rhône

•File active de l'Hôpital Nord-Ouest - Service de Médecine Interne, Maladies Infectieuses, Endocrinologie **VILLEFRANCHE-SUR-SAONE**

Le territoire du COREVIH Lyon Vallée du Rhône représente **une population de 3 307 503 habitants (recensement de 2016)**.

En 2016, 4 911 personnes étaient prises en charge par les 11 établissements de santé et 186 personnes prises en charge étaient nouvellement diagnostiquées séropositives pour le VIH.

En 2019, 5 365 personnes sont prises en charge **et seulement 134 personnes prises en charge étaient nouvellement diagnostiquées séropositives pour le VIH.**

35,07% ont été prises en charge à un stade avancé de l'infection par le VIH (CD4+ inférieurs à 200 par ml ou SIDA). **La transmission s'est faite par rapports homosexuels ou bi sexuels dans 46,65% des cas et par rapports hétérosexuels dans 41,60% des cas contre 47,23% et 41,18% des cas en 2016.**

Si l'on rapporte le nombre de personnes prises en charge nouvellement diagnostiquées à l'ensemble des personnes séropositives pour le VIH suivies dans les 11 établissements de santé du territoire, **on observe une baisse de 34% de ce rapport relatif, statistiquement significative : p < 0,0002.** La baisse est de 1.3% en absolu.



L'augmentation de l'offre de dépistage a probablement contribué à la diminution du nombre de personnes ignorant leur séropositivité : de nouvelles associations ont été habilitées par l'ARS à réaliser des tests d'orientation rapides (TROD), des actions de dépistage en outreach ont été déployées par les associations et les CegiDD en partenariat avec le COREVIH à destination des Hommes ayant des rapports sexuels avec des Hommes (HSH) et des personnes migrantes et précaires.

Cette baisse est également **concomitante du déploiement de la PreP**, la prophylaxie pré-exposition, au sein de la population des HSH du territoire Lyon Vallée du Rhône : **294 personnes étaient sous PreP en 2016 contre 1 445 en 2019**. Le traitement, basé sur la prise en continu ou en discontinu de Truvada® ou d'un de ses génériques, est autorisé et remboursé en France depuis mars 2016. Les personnes sous PreP bénéficient d'un bilan trimestriel de dépistage du VIH et des IST, facteur favorisant de la transmission du VIH.

Le recours au Traitement Post exposition (TPE) est en légère augmentation entre 2016 et 2019 (753 en 2016 et 823 en 2019), montrant toujours des prises de risque ou des accidents de préservatifs, mais une connaissance de l'offre de Traitement Post Exposition, empêchant la contamination par le VIH.

Le TASP (Treatment as prevention, ou traitement comme prévention en français), repose sur le fait qu'une personne séropositive pour le VIH, traitée par antirétroviraux, indétectable depuis plus de 6 mois et sans IST ne transmet pas le VIH. Dans la cohorte suivie au sein du territoire Lyon et la Vallée du Rhône en 2019, **98, 59% de la file active des personnes séropositives pour le VIH est sous traitement antirétroviral et 94, 91% a une charge virale indétectable (inférieure à 50 copies par ml)**. Ces bons résultats, proches de l'objectif **95-95-95** prévu pour 2030 par l'Onusida (95% des personnes séropositives dépistées, 95% sous traitement et 95% indétectables), sont également à prendre en compte pour expliquer ces résultats.

Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec la baisse de 16% des nouvelles contaminations par le VIH observées à Paris entre 2015 et 2018 et de 40% du nombre de personnes prises en charge nouvellement diagnostiquées séropositives pour le VIH dans les Alpes Maritimes sur la même période 2015 et 2018.

Nos chiffres sont intéressants par l'ampleur de la baisse et par le bassin de population concerné.

